

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bevespi Aerosphere 7,2 microgram/5 microgram aërosol, suspensie glycopyrronium/formoterolfumaraatdihydraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Bevespi Aerosphere en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
- Gebruiksaanwijzing

1. Wat is Bevespi Aerosphere en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bevespi Aerosphere bevat twee werkzame stoffen genaamd glycopyrronium en formoterolfumaraatdihydraat. Deze behoren tot een groep geneesmiddelen die langwerkende luchtwegverwijders worden genoemd.

Bevespi Aerosphere wordt gebruikt om het ademen gemakkelijker te maken voor volwassenen met een longziekte genaamd chronische obstructieve longziekte (COPD). COPD is een langdurige ziekte van de luchtwegen in de longen, die vaak wordt veroorzaakt door roken. Bij COPD trekken de spieren rond de luchtwegen zich samen, wat ademen moeilijk maakt.

Het geneesmiddel voorkomt het samentrekken van de spieren rond de luchtwegen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan gaan.

Bevespi Aerosphere levert de werkzame bestanddelen rechtstreeks af in de luchtwegen in uw longen terwijl u inademt. Het helpt de effecten van COPD op uw dagelijkse leven te verminderen.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor glycopyrronium, formoterolfumaraatdihydraat of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u hiervan niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bevespi Aerosphere wordt gebruikt als (langdurige) onderhoudsbehandeling voor COPD. Gebruik dit geneesmiddel niet om een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling te behandelen.

Acute ademhalingsproblemen

Als u last krijgt van een beklemmend gevoel op de borst, hoesten, piepende ademhaling of kortademigheid onmiddellijk na het gebruik van Bevespi Aerosphere:

Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp, omdat u mogelijk een ernstige aandoening heeft met de naam paradoxaal bronchospasme.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:

- u astma heeft. Gebruik dit geneesmiddel niet voor astma
- u hartproblemen heeft
- u diabetes heeft
- u een laag kaliumgehalte in uw bloed heeft
- u schildklierproblemen heeft (thyrotoxicose genaamd)
- u een oogprobleem heeft genaamd nauwe-kamerhoekglaucoom (ook gesloten-kamerhoekglaucoom genoemd)
- u prostaatproblemen heeft of problemen met plassen
- u lever- of nierproblemen heeft

Vertel uw arts altijd over andere gezondheidsproblemen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel is niet bestemd voor gebruik bij kinderen of jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bevespi Aerosphere nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen invloed hebben op de manier waarop dit geneesmiddel werkt of de kans vergroten dat u bijwerkingen krijgt. Hiertoe behoren:

- geneesmiddelen die op dezelfde manier werken als Bevespi Aerosphere, zoals geneesmiddelen die werkzame stoffen bevatten als tiotropium, ipratropium, aclidinium, umeclidinium, salmeterol, vilanterol, olodaterol of indacaterol. Weet u dit niet zeker? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het wordt niet aanbevolen om Bevespi Aerosphere samen met deze geneesmiddelen te gebruiken;
- geneesmiddelen die het kalium in uw bloed verlagen. Hiertoe behoren:
 - corticosteroiden die u via de mond inneemt (zoals prednisolon);
 - middelen om beter te kunnen plassen (diuretica genaamd zoals furosemide of hydrochloorthiazide), gebruikt bij hoge bloeddruk;
 - sommige geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van ademhalingsaandoeningen die methylxanthines worden genoemd (zoals theofylline);
- geneesmiddelen genaamd bètablokkers die kunnen worden gebruikt om hoge bloeddruk of andere hartproblemen te behandelen (zoals atenolol of propranolol) of om glaucoom te behandelen (zoals timolol);
- geneesmiddelen die het 'QT-interval' (een verandering in de elektrische activiteit van het hart) kunnen verlengen. Hiertoe behoren geneesmiddelen voor de behandeling van:
 - depressie (zoals monoamine-oxidaseremmers of tricyclische antidepressiva);
 - bacteriële infecties (zoals erytromycine, claritromycine, telitromycine);
 - allergische reacties (antihistaminica).

Als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is of als u dit niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent, tenzij uw arts u vertelt dat dit kan.

Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u vertelt dat dit kan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat dit geneesmiddel invloed heeft op uw vermogen om voertuigen te besturen en machines te bedienen. Duizeligheid en misselijkheid zijn echter vaak voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u last heeft van deze bijwerkingen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel gebruikt u?

De aanbevolen dosering is tweemaal daags twee pufjes.

Het is belangrijk om dit middel elke dag te gebruiken, zelfs als u op dat moment geen verschijnselen van COPD heeft.

Hoe gebruikt u het?

Dit middel is bestemd voor inhalatie.

Lees de gebruiksaanwijzing onderaan deze bijsluiters. Als u twijfelt over hoe u dit middel moet gebruiken, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik van Bevespi Aerosphere met een voorzetkamer

Als u het moeilijk vindt in te ademen en tegelijkertijd de inhalator in te drukken, bespreek dit dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kunt u een 'voorzetkamer' gebruiken bij uw inhalator.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer van dit middel heeft gebruikt dan zou moeten, bespreek dit dan onmiddellijk met uw arts of apotheker. Mogelijk heeft u medische hulp nodig. Het kan zijn dat uw hart sneller klopt dan normaal, dat u zich wankel voelt, stoornissen heeft in het zien, een droge mond of hoofdpijn heeft of zich misselijk voelt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de dosis alsnog zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over. Neem niet meer dan tweemaal daags twee pufjes.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Dit geneesmiddel is bestemd voor langdurig gebruik. Het heeft alleen effect zolang u het gebruikt. Stop niet tenzij uw arts u vertelt dat u dat moet doen, ook niet als u zich beter voelt, want uw verschijnselen kunnen verergeren. Als u met de behandeling wilt stoppen, moet u dit eerst met uw arts bespreken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen

Stop met het gebruik van dit middel en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende verschijnselen heeft:

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers:

- zwelling van uw gezicht, met name rond uw mond (zwelling van uw tong of keel kan het moeilijk maken om te slikken);
- huiduitslag of netelroos in combinatie met ademhalingsproblemen;
- plotseling een gevoel van flauwte hebben.

Deze verschijnselen kunnen tekenen zijn van een allergische reactie die ernstig kan worden.

Andere mogelijke bijwerkingen

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

- hoofdpijn
- droge mond
- misselijkheid
- spierkrampen
- pijn op de borst
- angst
- duizeligheid

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

- trillen of onvrijwillig beven
- hoge bloedsuikerspiegels
- opgewondenheid
- rusteloosheid
- moeite met slapen
- snelle of onregelmatige hartslag
- plasproblemen (urineretentie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in [aanhangsel V](#). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het zakje en het spuitbusje na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De inhalator kan worden gebruikt tot maximaal 3 maanden nadat het zakje voor het eerst werd geopend. Schrijf de datum waarop het zakje is geopend op het etiket van de inhalator in de daarvoor bestemde ruimte.

Bewaren beneden 30°C.

Waarschuwing: Het spuitbusje niet breken, doorprikken of verbranden, zelfs als het leeg lijkt te zijn. Niet aan temperaturen hoger dan 50°C blootstellen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn glycopyrronium en formoterolfumaraatdihydraat.

Elk afzonderlijk pufje bevat een dosis van 9 microgram glycopyrroniumbromide (overeenkomend met 7,2 microgram glycopyrronium) en 5 microgram formoterolfumaraatdihydraat.

- De andere stoffen in dit middel zijn norfluraan, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine en calciumchloride.

Hoe ziet Bevespi Aerosphere eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Bevespi Aerosphere is een aërosol, in suspensievorm.

Bevespi Aerosphere wordt geleverd in een spuitbusje met een dosisindicator, samen met een witte plastic houder en een mondstuk (zie afbeelding 1 van de gebruiksaanwijzing onderaan deze bijsluiter). Het mondstuk wordt afgedekt met een oranje beschermkap. Bevespi Aerosphere wordt geleverd in een foliezakje met een zakje droogmiddel en zit verpakt in een doos.

De werkzame stoffen zitten in een onder druk staande suspensie in het spuitbusje.

Bevespi Aerosphere is beschikbaar in een verpakking die 1 inhalator met 120 pufjes bevat en in een meerstuksverpakking die 3 inhalatoren, met elk 120 pufjes, bevat.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Zweden

Fabrikant

AstraZeneca Dunkerque Production
224 Avenue de la Dordogne
Dunkerque
59640
Frankrijk

AstraZeneca GmbH
Tinsdaler Weg 183
22880 Wedel
Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.
Tel: +32 2 370 48 11

България

АстраЗенека България ЕООД
Тел.: +359 24455000

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel: +420 222 807 111

Danmark

AstraZeneca A/S
Tlf: +45 43 66 64 62

Deutschland

AstraZeneca GmbH
Tel: +49 41 03 7080

Eesti

AstraZeneca
Tel: +372 6549 600

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.
Τηλ: +30 210 6871500

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Tel: +34 91 301 91 00

France

AstraZeneca
Tél: +33 1 41 29 40 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.
Tel: +385 1 4628 000

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd
Tel: +353 1609 7100

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Italia

AstraZeneca S.p.A.
Tel: +39 02 9801 1

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva
Tel: +370 5 2660550

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Magyarország

AstraZeneca Kft.
Tel.: +36 1 883 6500

Malta

Associated Drug Co. Ltd
Tel: +356 2277 8000

Nederland

AstraZeneca BV
Tel: +31 79 363 2222

Norge

AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH
Tel: +43 1 711 31 0

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 245 73 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 434 61 00

România

AstraZeneca Pharma SRL
Tel: +40 21 317 60 41

Slovenija

AstraZeneca UK Limited
Tel: +386 1 51 35 600

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.
Tel: +421 2 5737 7777

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ
Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB
Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija
Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd
Tel: +44 1582 836 836

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <{MM/JJJJ}><{maand JJJ}>.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: <http://www.ema.europa.eu>.

Gebruiksaanwijzing

Bevespi Aerosphere, 7,2 microgram/5 microgram aërosol, suspensie glycopyrronium/formoterolfumaraatdihydraat


Lees deze gebruiksaanwijzing en de bijsluiter voordat u begint met het gebruik van Bevespi Aerosphere en telkens wanneer u een nieuwe inhalator krijgt. Er kan nieuwe informatie zijn. Deze informatie moet worden gebruikt als aanvulling op een gesprek met uw arts over uw medische aandoening en behandeling.

Belangrijke informatie:

- **Uitsluitend voor inhalatie.**
- Gebruik Bevespi Aerosphere precies zoals uw arts u vertelt.
- Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft over het gebruik van uw inhalator.

De onderdelen van uw Bevespi Aerosphere inhalator (zie afbeelding 1):

- Bevespi Aerosphere wordt geleverd als een spuitbusje met dosisindicator, dat past in een houder.
 - **Gebruik** de Bevespi Aerosphere-houder **niet** met andere geneesmiddelen.
 - **Gebruik** het Bevespi Aerosphere-spuitbusje **niet** met een houder van een andere inhalator.



Afbeelding 1

- Bevespi Aerosphere wordt geleverd met een dosisindicator bovenop het spuitbusje (**zie afbeelding 1**). Het weergavevenster van de dosisindicator laat zien hoeveel pufjes geneesmiddel u nog over heeft. Telkens wanneer u op het midden van de dosisindicator drukt, wordt er een pufje geneesmiddel afgegeven.

Voordat u Bevespi Aerosphere voor de eerste keer gebruikt

Controleer voordat u Bevespi Aerosphere voor de eerste keer gebruikt, of de pijl op de dosisindicator rechts van de inhalatiemarkering '120' in het venster van de dosisindicator staat (**zie afbeelding 1**).

- De pijl staat op 120 nadat 10 pufjes Bevespi Aerosphere zijn afgegeven. Dit betekent dat er nog 120 pufjes geneesmiddel over zijn in het spuitbusje (**zie afbeelding 2a**).
- Nadat u nog 10 pufjes heeft gebruikt, staat de pijl tussen de 100 en 120. Dit betekent dat er nog 110 pufjes geneesmiddel over zijn in het spuitbusje (**zie afbeelding 2b**).
- De pijl staat op 100 nadat u nog 10 pufjes heeft genomen. Dit betekent dat er nog 100 pufjes geneesmiddel over zijn in het spuitbusje (**zie afbeelding 2c**).



Afbeelding 2a
120 pufjes




Afbeelding 2b
110 pufjes



Afbeelding 2c
100 pufjes

- Het venster van de dosisindicator verplaatst zich na elke 10 pufjes. Het getal in het venster van de dosisindicator verandert na elke 20 pufjes.




Afbeelding 2d

- De kleur in het venster van de dosisindicator verandert naar rood, zoals getoond in het gearceerde gebied, als er nog maar 20 pufjes geneesmiddel over zijn in uw inhalator (**zie afbeelding 2d**).
- Als de pijl de '0' bereikt, moet u stoppen met het gebruik van uw inhalator. Het is mogelijk dat uw inhalator niet leeg aanvoelt en het kan lijken alsof hij nog steeds werkt. Echter, als u hem blijft gebruiken, krijgt u niet de juiste hoeveelheid geneesmiddel.

Uw Bevespi Aerosphere inhalator gereed maken voor gebruik:

- Uw Bevespi Aerosphere-inhalator wordt geleverd in een foliezakje dat een zakje droogmiddel bevat.
 - Haal de Bevespi Aerosphere-inhalator uit het foliezakje.
 - Gooi het foliezakje en het zakje droogmiddel weg. Gebruik de inhalator niet als het droogmiddel uit het zakje is gelekt.




Afbeelding 3

Klaarmaken van uw Bevespi Aerosphere-inhalator:


Voordat u uw Bevespi Aerosphere-inhalator voor de eerste keer gebruikt, moet u de inhalator klaarmaken.

- Verwijder het beschermkapje van het mondstuk (zie afbeelding 3). Controleer de binnenzijde van het mondstuk voordat u de inhalator gebruikt om er zeker van te zijn dat deze niet geblokkeerd is.
- Houd de inhalator rechtop, weg van uw gezicht, en schud de inhalator goed (zie afbeelding 4).



Afbeelding 4

- Druk stevig op het midden van de dosisindicator tot het spuitbusje niet verder in de houder kan. Hierdoor komt een puffje geneesmiddel vrij uit het mondstuk (zie afbeelding 5). U kunt een zachte klik uit de dosisindicator horen als deze tijdens het gebruik aftelt.




Afbeelding 5

- **Herhaal de stappen voor het klaarmaken nog 3 maal (zie afbeelding 4 en afbeelding 5).** Schud de inhalator goed voorafgaand aan elk puffje bij het klaarmaken van de inhalator.
- Na 4 weggespoten puffjes moet de dosisindicator rechts van '120' staan en uw inhalator is nu klaar voor gebruik.


Gebruiken van uw Bevespi Aerosphere-inhalator:

Stap 1: Verwijder het beschermkapje van het mondstuk (zie afbeelding 6).




Afbeelding 6

Stap 2: Schud de inhalator goed voorafgaand aan elk gebruik (zie afbeelding 7).




Afbeelding 7

Stap 3: Houd de inhalator met het mondstuk naar u toe en adem uit via uw mond zo ver als u kunt zonder zich onprettig te voelen (zie afbeelding 8).




Afbeelding 8

Stap 4: Sluit uw lippen rond het mondstuk en houd uw hoofd iets achterover, terwijl u uw tong onder het mondstuk houdt (**zie afbeelding 9**).




Afbeelding 9

Stap 5: Druk, terwijl u langzaam en diep inademt, het midden van de dosisindicator omlaag tot het spuitbusje niet verder in de houder kan en een puffje geneesmiddel is afgegeven (**zie afbeelding 10**). Stop dan met drukken op de dosisindicator.




Afbeelding 10

Stap 6: Als u klaar bent met inademen, haalt u het mondstuk uit uw mond. Houd 10 seconden uw adem in of zolang als dit voor u comfortabel is (**zie afbeelding 11**).




Afbeelding 11

Stap 7: Adem rustig uit (zie afbeelding 12). Herhaal de stappen 2 tot en met 7 om uw tweede puffje Bevespi Aerosphere te nemen.



Afbeelding 12


Stap 8: Plaats direct na gebruik het beschermkapje weer op het mondstuk (zie afbeelding 13).



Afbeelding 13


Schoonmaken van uw Bevespi Aerosphere-inhalator:

Maak de inhalator gedurende de eerste 3 weken eenmaal per week schoon. Het is erg belangrijk om uw inhalator schoon te houden, zodat er geen geneesmiddel ophoopt dat de verstuiving via het mondstuk blokkeert (zie afbeelding 14).



Afbeelding 14


Stap 1: Haal het spuitbusje uit de houder (zie afbeelding 15). Reinig het spuitbusje **niet** en laat het niet nat worden.



Afbeelding 15

Stap 2: Haal het beschermkapje van het mondstuk.

Stap 3: Houd de houder onder de kraan en laat er ongeveer 30 seconden warm water door stromen. Draai de houder ondersteboven en spoel de houder nu via het mondstuk, ongeveer 30 seconden (zie afbeelding 16).




Afbeelding 16

Stap 4: Schud zoveel mogelijk water van de houder af.


Stap 5: Kijk in de houder en het mondstuk om er zeker van te zijn dat achtergebleven geneesmiddelresten geheel zijn weggespoeld. Als er geneesmiddel is achtergebleven, herhaalt u de stappen 3 tot en met 5 zoals hiervoor beschreven.

Stap 6: Laat de houder een nacht aan de lucht drogen (**zie afbeelding 17**). Plaats het spuitbusje **niet** terug in de houder als deze nog nat is.



Afbeelding 17

Stap 7: Als de houder droog is, kunt u het spuitbusje voorzichtig terugduwen in de houder (zie **afbeelding 18**). Druk niet te hard op het spuitbusje, want daardoor kan een puffje geneesmiddel vrijkomen.



Afbeelding 18

Stap 8: Maak uw **Bevespi Aerosphere**-inhalator na elke reiniging opnieuw klaar. Om de inhalator opnieuw klaar te maken, schudt u de inhalator goed en drukt u tweemaal op het midden van de dosisindicator, om in totaal 2 puffjes vrij te laten komen in de lucht, van uw gezicht af. Uw inhalator is nu klaar voor gebruik.

Als u uw Bevespi Aerosphere langer dan 7 dagen niet gebruikt of als de inhalator is blootgesteld aan lage temperaturen of is gevallen:

Als u uw Bevespi Aerosphere langer dan 7 dagen niet heeft gebruikt, of als de inhalator werd blootgesteld aan lage temperaturen of is gevallen, moet u deze opnieuw klaarmaken voor u hem weer gebruikt.

Om de inhalator opnieuw klaar te maken, schudt u de inhalator goed en drukt u tweemaal op het midden van de dosisindicator, om in totaal 2 puffjes vrij te laten komen in de lucht, van uw gezicht af. Uw inhalator is nu klaar voor gebruik.